



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

FICHA TECNICA COMERCIAL

FRUTO PLUS

Revisión: 04
Aprobado: JID
Fecha: 01-02-22
Página 1 de 4

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y COMPAÑÍA

Nombre comercial : **FRUTO PLUS**
Ingrediente Activo : TRIHORMONAL
Tipo del producto : NUTRIENTE

II. COMPOSICION NUTRICIONAL

Promotor de Citoquininas	0.132 mg/L
Promotor de Giberelinas	0.31 - 0.60 mg/L
Promotor de Auxinas	0.31 - 0.60 mg/L
Vitaminas B	0.015 mg/L
Nitrógeno (N)	13.00%
Fósforo (P ₂ O ₅)	12.00%
Potasio (K ₂ O)	3.00%
Zinc (ZnO)	1.00%
Magnesio (MgO)	1.00%
Calcio (CaO)	2.00%
Boro (B)	0.10%
Aminoácidos	30.00%
Sucratos	5.00%
Metabólitos fitoquímicos y microbianos	5.00%
Ácidos Húmico	12.00%
Extracto de Algas Marinas	20.00%

III. PROPIEDADES FISICOS QUIMICAS

Densidad: 1.1.10 - 1.25 g/ml
Salubridad: 4.00 g/l

IV. EVALUACION SENSORIAL

Aspecto: Color es café o marrón oscuro.
Olor: Característicos a compuestos marinos orgánicos
Textura: Densa en forma firme ausencia de defectos.

V. CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en ambientes fresco y aireados.

VI. CONSERVACION DE TRANSPORTE

Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo

Temperatura ambiente.

VII. GENERALIDADES

FRUTO PLUS

Es un bioestimulante probiótico ligados orgánicamente, actúa como un fisioactivador obteniendo una mayor disponibilidad y movilidad de los nutrientes, para aumentar la capacidad del sistema radicular, floración y maduración, se caracteriza por contar con una elevada cantidad de aminoácidos, alginatos, manitol, betainas, poliaminas, vitaminas y reguladores de crecimiento tipo auxinas, giberelinas y citoquininas de origen natural, provenientes de extractos de algas *Macrocystis pyrifera*, extractos metabólicos de yemas de plantas resinosas y extractos microbianos activadores fisiológicos que actúan como cofactores enzimáticos del metabolismo vegetal.

VIII. PROPIEDADES BENEFICIOS

FRUTO PLUS

Estimula la elongación y división celular y fomenta la brotación precoz, obteniéndose un mejor crecimiento. Se logra un balance nutricional y hormonal en la planta, el cual se debe a las cantidades en proporciones adecuadas entre los nutrientes permitiendo el desarrollo del máximo potencial genético de las plantas. Reduce los niveles de etileno en la planta, produciendo los resultados siguientes en los cultivos: Mayor desarrollo radicular y mayor número de yemas de fructificación. Mayor producción de partes cosechables y frutos de mayor tamaño. Menor estrés en la planta. Más ramas laterales y mayor cuajado en el tercio superior, en cultivos de fructificación múltiple. Incrementa el contenido de proteínas y polisacáridos en los órganos de almacenamiento: raíces, tubérculos, frutos y granos.

IX. DOSIS Y APLICACIONES

FRUTO PLUS

Para cualquier cultivo, de acuerdo con las necesidades nutricionales y según análisis foliar y de suelos. El Ingeniero de campo recomendará para cada cultivo y en cada etapa de desarrollo el número de aplicaciones de la dosis siguiente:

Foliar: 0.25 a 0.50L/ 200L

Al suelo: 1- 2L/Ha.

CULTIVOS	DOSIS CIL. 200L	MOMENTO DE APLICACION
Arroz.	0.25 – 0.50 L	Aplicar en macollamiento y punto de algodón.
Papa.	0.25 – 0.50 L	En macollamiento y en inicio del desarrollo del tubérculo.
Soya, lenteja, frijol, garbanzo, etc.	0.25 – 0.50 L	Aplicar después del primer abonamiento y al inicio de floración.
Espárrago.	0.25 – 0.50 L	Durante el desarrollo vegetativo foliar cada 15- 20 días.
Algodón.	0.25 – 0.50 L	En la impregnación de la semilla, después del deshije y en



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

		prefloración.
Mango, lúculo, manzano, palto, olivo,	0.25 – 0.50 L	En prefloración y después del cuajado de frutos.
Loche, zapallo, melón, sandía.	0.25 – 0.50 L	Al inicio de guías, al inicio de floración y crecimiento de fruto.
Vid.	0.25 - 1 L	Realizar de 3 - 4 aplicaciones desde el desarrollo de hasta el cuajado.
Café y cacao.	0.25 – 0.50 L	Aplicar en crecimiento vegetativo e inicio de floración.
Cebolla y ajo.	0.25 – 0.50 L	Cuando alcanzan 8 - 10 cm. de altura, luego repetir a las 3- 6 semanas.
Alfalfa	0.250 – 0.50 L	Aplicar a los 15 días después de cada corte.
Maracuyá, granadilla, Mandarina, toronja, limón, naranja, etc.	0.25 – 0.50 L	Aplicar en crecimiento vegetativo, floración y brota miento.
Tomate, ají páprika, pimienta.	0.25 – 0.50 L	Después del trasplante cada 2 semanas.

X. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

FRUTO PLUS

-Es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes, sin embargo, por precaución antes de hacer la pre mezcla se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. -No mezclar con calcio, cobres, sulfatos, aceite, ni productos muy alcalinos. No es tóxico para el hombre, animales y flora.

-Por seguridad debe mantener el frasco fuera del alcance de los niños.

-Evitar la ingestión, contacto con la piel y los ojos. No exponer por mucho tiempo a los rayos solares.

XI. RECOMENDACIONES

FRUTO PLUS

Se recomienda aplicar por vía foliar pulverizado con equipos de fumigación (cuando se utilice atomizadores duplicar la dosis indicada) también aplicar por los sistemas de riego tecnificado (goteo aspersión etc).

XII. PRESENTACION ORIGEN

Presentación: Frasco 1L - Galón 5L – bidón 20L – cilindro 200L

Origen: España

Duración: 3 Años.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX- Centro de Información, Control Tóxico y Apoyo a la Gestión Ambiental. Teléfono: 328-7398 Línea Gratuita: 0-

Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

800-1-3040 (Atención 24 h) ALO ESSALUD– Centro de Información de Farmacología y Toxicología. Teléfono: 472-2113.

XIII. DATOS DEL PRODUCTOR

Formulaciones del Perú S.A.C. FD Perú S.A.C. Los Olivos – Lima / Embazado
Para Grupo Agroconstructor T&V Elithe S.A.C. Psj. El tunante N°. 32
Huamachuco - La Libertad - Perú. ventas@agrobayerlomejor.com -
agrobayerlomejor.com

XIV. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

