



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

FICHA TECNICA COMERCIAL

PROMALMAX

Revisión: 04
Aprobado: JID
Fecha: 01-02-22
Página 1 de 3

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y COMPAÑÍA

Nombre comercial : **PROMALMAX**
Ingrediente Activo : REGULADOR DE CRECIMIENTO
Tipo del producto : CONCENTRADO SOLUBLE

II. COMPOSICION NUTRICIONAL

Citoquinina 1.8 %
Giberelina 1.8 %

III. EVALUACION SENSORIAL

Aspecto: Color es café o marrón claro.
Olor: Característicos a compuestos marinos orgánicos
Textura: Densa en forma firme ausencia de defectos.

IV. CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en ambientes fresco y aireados.

V. CONSERVACION DE TRANSPORTE

Temperatura ambiente.

VI. GENERALIDADES

PROMALMAX

Es un regulador de crecimiento que estimula la división celular, promueve el inicio del botoneo y el desarrollo y el crecimiento radicular, mejorando la calidad de la producción e incrementando las cosechas en algodón, tomate, papa, paprika, ají, palto, arándano, etc

VII. PROPIEDADES BENEFICIOS

PROMALMAX

Estimula la división celular, revierte la dominancia rápida, interviene en el crecimiento de las yemas y el desarrollo del fruto, mejora el desarrollo de las hojas y estimula el crecimiento radicular.

Estimula el Crecimiento Y/O alargamiento de las células y de las paredes también, estimula el crecimiento para una mejor floración, también en el crecimiento del embrión de la plántula

VIII. DOSIS Y APLICACIONES



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

PROMALMAX

Aplicar cuando las condiciones estén calmadas por el viento no causen excesiva fuerza. Para tener una Buena absorción del producto por la planta, la humedad puede ser relativa elevada, tiempo fresco y condiciones que eviten el rápido secado de las gotitas de la aspersión sobre la superficie vegetal. Está especialmente recomendada la aplicación nocturna. Foliar: 60 a 125 ml / 200L Al suelo: 125 – 250 L/Ha.

CULTIVOS	DOSIS CIL. 200L	MOMENTO DE APLICACION
Papa.	60 ml	Inicio de tuberización, Variedad tardía: Fraccionada 1° aplic: inicio de tuberización 2° aplic: 15 días después de la primera
Tomate.	60 – 90 ml	1° aplic: inicio de floración. 2° aplic: 15 a 20 días después de la primera
Arroz.	30 ml	Inicio de macollamiento.
Ají pprika.	60 ml	1° aplic: al inicio de la primera floracin. 2° aplic: al cuajado de la primera floracin. 3° aplic: en la maduracin de la primera floracin.
Frutales, palto, Ctricos, vid.	120 ml	Desde el momento de plena floracin hasta el comienzo de la cada de ptalos.
Mango, lcumo, manzano, palto, olivo,	0.25 – 0.50 L	En prefloracin y despus del cuajado de frutos.
Fresa.	60 ml	Inicio de floracin: 1° aplic: a los 30 das del trasplante 2° aplic: 30 das despus de la primera 3° aplic: 30 das despus de la segunda

IX. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

PROMALMAX

-Es compatible con la mayora de los agroqumicos comunes, sin embargo, por precaucin antes de hacer la pre mezcla se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. -No mezclar con calcio, cobres, sulfatos, aceite, ni productos muy alcalinos. No es txico para el hombre, animales y flora.

-Por seguridad debe mantener el frasco fuera del alcance de los nios.

-Evitar la ingestn, contacto con la piel y los ojos. No exponer por mucho tiempo a los rayos solares.

X. RECOMENDACIONES

PROMALMAX

Se recomienda aplicar por va foliar pulverizado con equipos de fumigacin (cuando se utilice atomizadores duplicar la dosis indicada) tambin aplicar por los sistemas de riego tecnificado (goteo aspersin etc).

XI. PRESENTACION ORIGEN

Presentación: Frasco 30 ML – 125ML.

Origen: España

Duración: 3 Años.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX- Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental. Teléfono: 328-7398 Línea Gratuita: 0-800-1-3040 (Atención 24 h) ALO ESSALUD– Centro de Información de Farmacología y Toxicología. Teléfono: 472-2113.

XII. DATOS DEL PRODUCTOR

Formulaciones del Perú S.A.C. FD Perú S.A.C. Los Olivos – Lima / Embazado
Para Grupo Agroconstructor T&V Elithe S.A.C. Psj. El tunante N°. 32
Huamachuco - La Libertad - Perú. ventas@agrobayerlomejor.com -
agrobayerlomejor.com

XIII. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

