



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

FICHA TECNICA

SANITO CUY



ESPECIE DE DESTINO

- Aves
- Patos
- Pavos
- Cerdos
- Cuyes
- Conejos

TIPO

Solución oral

FÓRMULA

Composición;

Enrofloxacina: 100 mg

Vitamina B12

DESCRIPCIÓN

SANITO CUY, Administración por vía oral, en el agua de bebida (p. 1). La cantidad de enrofloxacinina efectiva es de 10 mg/kg p.v. (p. 1). Pollos: 0,5 ml de SANITO CUY por litro de agua de bebida (p. 1). Conejos: 1 ml de SANITO CUY por litro de agua de bebida (p. 1). El

Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

tratamiento se realiza durante 3 a 5 días en pollos y durante 5 días en conejos (p. 1).Renovar diariamente el agua de bebida medicada (p. 1).Si no existe mejora en los 3 días siguientes de iniciada la terapia, puede estar indicando un cambio en la terapia escogida (p. 1).Debido a la forma de administración del producto y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal para asegurar una dosificación correcta, la concentración de antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de pienso y agua (p. 1).

INDICACIONES

SANITO CUY, Esta indicado en **Cuyes**, Tratamiento de infecciones causadas por *E. Coli*, *Salmonella* (p. 1). **Conejos**: *Salmonella spp.* y *Mycoplasma spp.* (p. 1) Pollos, Tratamiento de infecciones causadas por *E. Coli* (p. 1). Pavos, *Salmonella spp.* y *Mycoplasma spp.* (p. 1)

VIA ADMINISTRACIÓN

Oral

DÓSIS

Dosis de 20 mg/Kg p.v. (2 veces las dosis recomendadas) administrada durante 15 días (3 veces el tiempo de administración propuesto) no manifestaron reacciones adversas (p. 1).En caso de producirse sobredosificación, la sintomatología consistiría en una débil estimulación de la movilidad espontánea, por lo que debería suspenderse el tratamiento (p. 1).La intoxicación puede causar náuseas, vómitos y diarreas (p. 1).

PRESENTACIÓN

Frasco de 1 lt – 500 ml – 100 ml – 30 ml.

ADVERTENCIAS

Insuficiencia renal o hepática (p. 1).No deben tratarse animales con trastornos del crecimiento cartilaginoso (p. 1).Infecciones producidas por microorganismos resistentes a las quinolonas (p. 1)

RECOMENDACIONES

- Mantener a temperaturas entre 15°C y 30°C.
- Consérvese en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Para uso exclusivo veterinario.



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

- Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Proteger de la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 15°C y 30°C.

Fabricado por: HIPRA SAUDE ANIMAL LTDA
Avenida do lami 6133 - Barrio Lami
Porto Alegre - RS CEP 91782-601
CNPJ 92662.501/0001-51IE:0960531289